

## Уборка многолетних трав



Наилучшим сроками скашивания бобовых трав признаны фазы **бутонизации – начало цветения, злаковых колошения – начала цветения.**

## Уборка однолетних трав



Однолетних трав обычно убирают при появлении первых признаков высыхания листьев в нижней части растения и 27-30% сухого вещества. Уборка на зерно осуществляется при достижении зерном фазы полной спелости

## Различают фазы спелости семян

Молочную

Цвет семян зеленый

Восковую

Цвет семян серый однако их сохраняет слабо зеленоватый оттенок, эти семена еще не затвердели

Полную

Цвет семян серый, однако часть их сохраняет слабо зеленоватый оттенок, эти семена еще не хатвердили




# УБОРКА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

## Влажность семян



Суданская трава при уборке -26-30%  
 Сорго – 15-17%

## Хранения корма




При открытом хранении сена необходимо использование укрывной пленки или соломы, стог следует очесывать во избежание накопления влаги при осадках. Сенник должен быть хорошо вентилируемым, сено складывают при влажности воздуха не более 75% для предотвращения самонагрева

## Сроки уборки сена и сенажа

Первый укос нужно проводить в начале бутонизации, а можно и раньше – исходя из природно-климатических условий. Все последующие укосы необходимо проводить при 10-ти процентном цветении, так как более ранние сроки скашивания приведут к истощению растения.



## Высота скашивания



не ниже 10-12 см, при более низком повреждаются почки культуры, заготавливаемая масса загрязняется землей, стебель в нижней части беднее протеином, а уровень клетчатки выше. Одновременно проводят плющение для ускорения высыхания.