



Естікті дайындау

Астық шабу

Донгелете

егістіктер жақсы тегістелген, пішіні төртбұрышты, конфигурациясы дұрыс емес, көлемі шағын



-Егістік алқаптарын төсеу және шабу астықты орудылармен жаппай шабу басталғанға дейін 2-3 күн бұрын басталуы керек.

- Бағананың еңісін және орналасу бағытын ескеру қажет
- Алаңның ұзын жағы жер жырту бағытымен сәйкес келуі қажет

Жетекші жолмен

1:5-1:8 тікбұрышты егістіктер, осылайша бос тұрған машиналар аз болады

Дәннің ылғалдылығы



Жинаудың басталуы:

Тікелей комбайндау – 16,0-18,0%

Бөлек әдіс - 25,0-35,0%

Оңтайлы кесу биіктігі

Тікелей дәнді дақылдарды жинауды катушкалардың тырмалары масақтан санап, сабақты биіктіктің 2/3 бөлігінен кем емес ажырататындай етіп жүргізеді.



Төмен өсетін (60-80 см) – 15-18 см

Орташа биіктікті (80-120 см) – 20-25 см
Ұзын (120 см немесе одан жоғары) - 30 см-ге дейін рұқсат етіледі

Бөлек комбайндау

-Тұқым өсіру учаскелері, орналасуға бейім сорттар, жоғары сабақты, біркелкі емес пісетін, арамшөптері немесе сабақтары көп дақылдар

-Балауыз пісетін ортадағы егісті шабу

-3-4 күннен кейін орамдарды таңдау (комбайн бір бағытта орақтармен қозғалады)

Артықшылықтары:

- Тазалауды 5-6 күн бұрын бастауға болады
- Астықтың сапасы жақсы, ылғалдылығы төмен, өнгіштігі жоғары және зақымдануы аз
- Кептірілген сабан



ДӘНДІ ДАҚЫЛДАРДЫ ЖИНАУ

Тікелей комбайндау



- Жартылай және қысқа сабақты бидай-таңғы және кешке,
- қатты егілген дақылдар-құрғақ уақытта
- Толық піскен кезде жинау 85,0-90,0% астық


Егін жинау алдындағы кептіру (десикация)

Егін жинаудан 2 апта бұрын дақылдарды бүрку



- Астықтың ылғалдылығын 7,5-15,0%-ға, астықтың ластануын 2,5-2,6% -ға, арамшөптердің жер үсті массасын 88,0-100,0%-ға төмендетеді.
- Жинау кезінде егіннің 10,0-15,0% дейін сақтайды.
- Сапалы тазалауға кепілдік береді
- Жанармайдың 15,0% дейін үнемдейді

Астықты кептіру



Арамшөптерді кетіру үшін астықты алғашқы тазарту Ылғалдылығы 18,0%-дан жоғары астықты 1 тәуліктен артық сақтауға болмайды
Кондиционер ылғалдылығына дейін кептіру 1 өту үшін ылғалдылықтың 4,0%-дан астамын алып тастауға болмайды

Астықты тасымалдау және сақтау



Ылғалдылық:

- азық және жемдік дәндер – 14,0-15,0%,
- тұқымдық дәндер – 12,0-13,0%