



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УБОРОЧНЫХ РАБОТ НА РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Технология уборки

Раздельная уборка



Конец августа - начало сентября
и продолжается до октября

Неравномерное созревание посевов

Высокая влажность зерна и стебля
(20-25% → 16-18%)

2 этапа:

- скашивание риса в валки с помощью валковых жаток;
- обмолот валков комбайнами (через 1-2 дня)

Прямая уборка



Равномерное созревание риса

Влажность зерна не выше 22–24%

Благоприятные погодные условия

Условия и требования к хранению риса

Сухие склады, хорошо проветриваемые,
герметичные



Наличие вентиляционной системы и
систем контроля температуры и
влажности



+5...+15 °C



Влажность воздуха:
не выше 60–65%



Влажность риса: не
выше 14–15%



Недопуск образования
конденсата



Осмотр запасов
(не реже 1 раза за 10-14 дней)



Инсектицидные и
фунгицидные средства




До 12 месяцев
Семенной рис - в течение 6–8
месяцев после уборки

Система обработки почвы, внесение органических и минеральных удобрений



Зяблевая вспашка и
дискование
Глубина 25-27 см



15-20 т/га



150-200 кг/га

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ КҮРІШ АУЫСПАЛЫ ЕГІСІНДЕ ЕГІН ЖИНАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР



Егін жинау технологиясы

Бөлек ору



Егіс алқабы біркелкі піспегенде

Дән мен сабағының ылғалдылығы жоғары
(20-25% → 16-18%)

2 кезеңдер:

- күріш валокқа шалғы жаткалармен орылып, жатқызылады;
- валоктар комбайнмен бастырылады (1–2 күннен кейін)

Тікелей ору



Егіс алқабында біркелкі пісуі

Дәннің ылғалдылығы 22–24%-дан аспаған жағдайда

Ауа райының құрғақ әрі тұрақты болуы

Күрішті сақтау шарттары мен талаптары



Қоймалар құрғақ, жақсы желдетілетін, герметикалық болуы керек

Желдету жүйесінің және температура мен ылғалдылықты бақылау жүйесінің болуы



+5...+15 °C



Күріштің ылғалдылығы:
14–15%-тен жоғары емес



Ауаның ылғалдылығы: 60–65%-тен жоғары емес



Конденсат түзілуіне жол берілмейді



Қойманы тексеру (кемінде 10–14 күн сайын)



Инсектицидтік және фунгицидтік құралдарды қолдану




12 айға дейін

Тұқымдық күрішті жинағаннан кейін 6–8 ай ішінде пайдалану ұсынылады

Топырақты өңдеу жүйесі, органикалық және минералдық тыңайтқыштарды енгізу



Айдау және дискілеу жұмыстары жүргізіледі
Тереңдігі 25-27 см



15-20 т/га



150-200 кг/га